

MICOTASTE® Solución

Miconazol 2 % · solución tópica · venta libre

MANUAL CLÍNICO

Espectro terapéutico basado en evidencia: papel, respuesta, tiempo y magnitud

Documento de apoyo a la decisión para profesionales de la salud

Laboratorio Skinderm S.A. · Línea OTC

Edición 2026

Cómo usar este manual

El inserto describe el producto de forma básica. Este manual reúne las micosis en las que el miconazol es útil y por qué el **vehículo en solución** es la mejor elección en superficies amplias o pilosas, con las 4 métricas en cada una.

Papel: **1.ª línea**

Mismo activo, vehículo para cubrir más superficie: miconazol 2 % de amplio espectro en **solución**, que se distribuye de forma **homogénea sobre grandes superficies y zonas con vello**.¹

1 · Pitiriasis versicolor extensa (tronco) **1.ª línea**

Papel	1.ª línea tópica en la versicolor del tronco (superficie amplia).
Respuesta	Aclaramiento de las lesiones (activo frente a <i>Malassezia</i>). ^{1,3}
Tiempo	Semanas; la repigmentación es más tardía. ³
Magnitud	Moderada–alta sobre el hongo.

2 · Tiña corporis extensa **1.ª línea**

Papel	1.ª línea en placas extensas donde la solución cubre mejor.
Respuesta	Aplicación homogénea y eficaz frente a dermatofitos. ²
Tiempo	2–4 semanas.
Magnitud	Alta.

3 · Tiña cruris **1.ª línea**

Papel	1.ª línea; cómoda en zona pilosa.
Respuesta	Eficaz frente a dermatofitos. ²
Tiempo	2–4 semanas.
Magnitud	Alta.

4 · Candidiasis cutánea **1.ª línea**

Papel	1.ª línea en candidiasis de la piel.
Respuesta	Activo frente a <i>Candida</i> ; buena respuesta. ¹
Tiempo	Semanas.
Magnitud	Alta.

5 · Tiña pedis 1.ª línea

Papel	1.ª línea tópica.
Respuesta	Buenas tasas de curación. ²
Tiempo	2–5 semanas; continuar 1 semana tras la mejoría. ⁴
Magnitud	Alta.

Cuadro maestro de decisión

Problema	Papel	Respuesta	Tiempo	Magnitud
Pitiriasis versicolor extensa	1.ª línea	Aclaramiento (repigm. tardía)	semanas	Moderada–alta
Tiña corporis extensa	1.ª línea	Aplicación homogénea	2–4 sem	Alta
Tiña cruris	1.ª línea	Eficaz	2–4 sem	Alta
Candidiasis cutánea	1.ª línea	Buena	semanas	Alta
Tiña pedis	1.ª línea	Buena curación	2–5 sem	Alta

Lo esencial del inserto

Posología. Aplicar 1–2 veces/día, 2–5 semanas, continuar 1 semana tras la mejoría. Uso externo; evitar ojos y mucosas. Interacción a recordar: puede potenciar anticoagulantes orales (warfarina). El detalle completo figura en la ficha técnica, que prevalece.⁴

Bibliografía

1. Sawyer PR, Brogden RN, Pinder RM, Speight TM, Avery GS. Miconazole: a review of its antifungal activity and therapeutic efficacy. *Drugs*. 1975;9(6):406–423.
2. Crawford F, Hollis S. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;(3):CD001434.
3. Hu SW, Bigby M. Pityriasis versicolor: a systematic review of interventions. *Arch Dermatol*. 2010;146(10):1132–1140.
4. Skinderm S.A. Inserto de MICOTASTE® Solución tópica (Nitrato de miconazol 2 %). Fabricado por Laboratorios Chefar S.A. para Laboratorios Dermatológicos Skinderm S.A., Ecuador.

MICOTASTE® es marca registrada de Skinderm S.A. — Manual clínico de apoyo a la decisión para profesionales de la salud; no es publicidad al público general. Complementa la ficha técnica aprobada por ARCSA y el juicio clínico. Edición 2026.