

**PREDCOR**Prednisona 5 mg/ 20 mg
Corticoterapia**COMPOSICIÓN**

Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg: Excipientes: Lactosa monohidratada, almidón glicolato de sodio, almidón de maíz, estearato de magnesio, laca aluminica roja N140 C.I. 16035, agua.

GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO

Corticoide

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

PREDCOR está indicado en el tratamiento de diversas enfermedades reumáticas del colágeno, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, oftalmológicas, respiratorias, hematológicas y otras que respondan a la corticoterapia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la prednisona. Contraindicado en enfermedades sistémicas, micóticas, virales, tuberculosis y durante el embarazo.

ADVERTENCIAS

Producto de uso delicado. Adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica. Mantener fuera del alcance de los niños.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Catarata subcapsular, hipoplasia suprarrenal, depresión del eje hipofisis suprarrenal, síndrome de Cushing, obesidad, osteoporosis, gastritis, aumento de la presión intraocular, hiperglucemia, catabolismo muscular rápido, cicatrización retardada y retraso del crecimiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La administración simultánea con fenobarbital, fenitoina, efedrina disminuye el efecto terapéutico de la prednisona al incrementar el metabolismo de ésta.

Pacientes que reciben prednisona y estrógeno pueden presentar efecto corticosteroide excesivo.

Corticosterolde y diurético puede producir depleción de potasio que favorece la hipocaliemia.

Corticoide con glucósidos puede elevar la posibilidad de arritmias o intoxicación por digital asociado.

Corticosteroides con anticoagulantes tipo cumarina pueden aumentar o disminuir los efectos anticoagulantes.

La combinación de glucocorticoides con antiinflamatorios no corticoides puede producir úlceras gastrointestinales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

PREDCOR se administra via oral. El régimen posológico varía y se debe determinar individualmente de acuerdo con la enfermedad especifica su gravedad y la respuesta del paciente.

SOBREDOSIFICACIÓN

La sobredosificación de prednisona no se considera potencialmente fatal.

En caso de intoxicación por sobredosis se debe inducir el vómito, practicar lavado gástrico y manejo sintomático de las complicaciones resultantes del efecto metabólico del corticosteroide o de la enfermedad básica o concomitante o resultante de la interacción.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja x 1, 2, 3, 5 blisters con 10 tabletas cada uno

MUESTRA MÉDICA

Caja x 1, 2 blisters con 1, 2 tabletas cada uno

PRESENTACIÓN HOSPITALARIA

Caja x 10, 15, 25 blisters con 10 tabletas cada uno

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños..

REG. SAN. No. 366940713**IMA CHARIK**

Sapan hampi muyu charinmi:Prednisona 5 mg; Charishkakuna: Lactosa monohidratada, almidón licolato de sodio, almidón de maíz, estearato de magnesio, laca aluminica roja N140 C.I. 16035, yaku.

IMA HAMPI LAYAMAN WANKURISHKA

Corticoide

IMAPAK UPIYANA

PREDCOR hampika reumáticas del colágeno, endocrina, dermatológica, alérgica, oftalmológicas, respiratorias, hematológica tawka unkuykunapakmi shinallatak corticoide unkuyma wankurishkakunapash kan.

MANA UPIYANA

Prednisona hampita mana chaskiy ushkakuna.

Sistémicas, micóticas, virales, tuberculosis unkuykunawan kashpa shinallatak wiksayuk kashpapash kay hampita mana upiyanachu.

AMA KUNKASHPA:

Hawalla hampimi kan. Hampikpak mañaywan shinallatak paypak kamaykuywan upiyana. Wawakunamanta karulla charina.

LLAKIKUNA RIKURIMUN

Catarata subcapsular, hipoplasia suprarrenal, depresión del eje hipofisis suprarrenal, síndrome de Cushing, obesidad, osteoporosis, gastritis, presión intraocular mirarin, hiperglucemia, utka catabolismo muscular, chukri mana utka chakin shinallatak allimanta wiñan.

LLAKIKUNA RIKURIMUN

Catarata subcapsular, hipoplasia suprarrenal, depresión del eje hipofisis suprarrenal, síndrome de Cushing, obesidad, osteoporosis, gastritis, presión intraocular mirarin, hiperglucemia, utka catabolismo muscular, chukri mana utka chakin shinallatak allimanta winan.

SHUK HAMPIKUNAWAN

Fenobarbital, fenitoina, efedrina hampikunawan pakta uplyakpi prednisona hamplyta pichiyachin, kaypak metabolismo nishkata mirachlymanta.

Prednisona shinallatak estrógeno ham.pita upiyakkuna efecto corticosteroide excesivo nishkata charly usan.

Corticosteroide shinallatak diurético hampikuna potasio-pishiyachin, kayka hipocaliemia nishkapi yanapan.

Corticoide hampi glucósido hampikunawan arritmia nishkata mirachiy ushan, nakashpaka digital asociado nishkamanta intoxicación.

Corticosteroide hampikuna anticoagulantes hampikunawan yawar tukruiyayta mirachin nakashpaka pishiyachin.

Glucocorticoides hampikunawan punki pishiyachin hampikunawan. pakta upiyashkamanta úlceras gastrointestinales nishkata wiñachiy ushanmi.

MASHNATAK SHINALLTAK IMASHINA UPIYANA

PREDCOR upiyana hampimi kan. Ima unkuyta charikta rikushpa shinallatak unkuk mashnatak chaskikta rikushpami hampita kuna.

HAMPITA YAPALLA UPIYAYMANTA

Prednisona hampita yapalla upiyashkamanta mana wañuyman apanchu.

Hampita yapalla upiyashka karpika lansachina, wiksata mayllachina shinallatak imashina katikta rikuna.

HATUYPAK TUPU

Millka x 1, 2, 3, 5 sapan chuya puntukuna 10 muyukunawan

HAMPIKPAK TUPU

Millka x 1, 2 sapan chuya puntukuna 1,2 muyukunawan

HAMPIWASIPAK TUPU

Millka x 10, 15, 25 sapan chuya puntukuna 10 muyukunawa

WAKAYCHIY

30°C chirikunukta mana yallishpa charina

Chirilla chakishka kuskapi charina

Tukuy hampikunata wawakunamanta karullami charina.

ELABORADO POR QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. QUITO- ECUADOR
PARA SKINDERM S.A. CUENCA- ECUADOR