



# TERFINAMED

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Terbinafina clorhidrato equivalente a Terbinafina base 250 mg. Excipientes:

Celulosa microcristalina, Almidón glicolato de sodio, Polivinilpirrolidona, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de magnesio.

GRUPO TERAPÉUTICO:

Antifúngico

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y MECANISMO DE ACCIÓN

La Terbinafina es una alilamina que tiene un amplio espectro de actividad antimicótica frente a hongos patógenos de la piel, pelo y uñas incluyendo dermatofitos.

FARMACOCINÉTICA:

Una dosis oral única de 250 mg de Terbinafina da lugar a concentraciones plasmáticas máximas de 0,97 mg/ml

dentro de las 2 horas de la administración. La Terbinafina se une fuertemente a proteínas plasmáticas (99%). Se excreta asimismo en el sebo, alcanzando así altas concentraciones en los folículos pilosos, el pelo y en las áreas seboreicas de la piel.

La biotransformación de la Terbinafina da lugar a metabolitos sin actividad antimicótica, que se excretan predominantemente en la orina, pero la tasa de eliminación puede ser menor en pacientes con insuficiencia renal o hepática, conduciendo a niveles Terbinafina más elevados. Vía tópica: Menos del 5% de la dosis es absorbida tras la aplicación local a seres humanos, así, la exposición general es muy baja.

Cuando se administra por vía tópica posee un comienzo rápido de acción y puede ser efectivo con una tratamiento de corta duración.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

- Onicomiosis causada por hongos dermatofitos.
- Tiña capitis.
- Infecciones micóticas de la piel tales como: tiña corporis, tiña cruris y tiña pedis.
- Infecciones cutáneas por levaduras causadas por el género *Cándida* (por ej.: *Cándida albicans*)

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la terbinafina o a cualquiera de los componentes.

Contraindicado en embarazo y lactancia e insuficiencia hepática o renal.

PRECAUCIONES:

A menos que su doctor le indique de otro modo, continúe con su régimen de alimentación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. Producto de uso delicado.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Según los resultados de los estudios llevados a cabo in vitro y en voluntarios sanos, es mínima la capacidad de la Terbinafina para inhibir o inducir el clearance de la mayoría de los medicamentos.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

En general la Terbinafina es bien tolerada. Los efectos adversos son leves a moderados y transitorios. Los más comunes son los gastrointestinales y reacciones músculo esqueléticas (artralgias y mialgias).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Niños < 20 kg de peso: 62,5 mg 1 vez al día. Adultos: 1 comprimido de 250 mg una vez al día.

Duración recomendada del tratamiento:

Tiña pedis 2 a 6 semanas. Tiña corporis, cruris: 2-4 semanas. Candidiasis cutánea: 2-4 semanas. En la mayoría de los pacientes, la duración para que un tratamiento tenga éxito es de 6 a 12 semanas.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese a una temperatura mayor a 30°C. Consérvese en un lugar fresco y seco. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja x 1, 2, 3, 4, 5, 10 blísteres con 10 comprimidos cada uno.

Caja x 1, 2, 3, 4 blísteres con 7 comprimidos cada uno.

MUESTRA MÉDICA:

Caja x 1 blister con 1, 2 comprimidos cada uno.

PRESENTACIÓN HOSPITALARIA:

Caja x 10, 15, 20 blísteres con 10 comprimidos cada uno

IMA CHARIK:

Sapan taka hampi charinmi:

Terbinafina clorhidrato hampika Terbinafina base 250 mg chaniyukmi; Charishkakuna: Celulosa microcristalina. Almidón glicolato de sodio, Polivinilpirrolidona, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de magnesio.

IMA HAMPI LAYAMAN WANKURISHKA:

Antifúngico

IMASHINA: Upiyana hampi.

KAY HAMPI IMAPAK ALLI KAN:

Terbinafina hampika kara sisu, akcha Sisus hinallatak sillu sisukunata hampikmi kan.

HAMPI IMATAK RURAK:

Shuk upiyay 250mg Terbinafina hampika yawarpi 0,97 mg/ml upiyash-kamanta 2 pachapi tantarin. Terbinafina hampika yawar wiraman wankurin (99%). Akcha karaman llukshin, akchakunaman hinallatak shuk wiralla kara kuskamanpash. Terbinafina hampika ishpapi llukshina shinapash maykan yaku shunku unkushka kakkunaka mana tukuylla surkunchu. Hawishpa: 5% patsakri uraymi runakuna chaskin. Hawikpika utkalla, allipacha ashalla pachakunapimi hampinka.

IMPAK UPIYANA:

- Dermofitos sisu Onicomiosis nanayman tikrayman.
- Tina capitis.
- Tiña corporis, tiña cruris hinallatak tiña pedis,
- Candida (*Cándida albicans*) sisu karata unkuchishkapi.

MANA UPIYANA:

Terbinafina hampita mana chaskiy ushakkunaman nakashpaka maykanpash kay hampipi shamuktapash.

Wiksayukkunaman chuchuchikuyupi mana hampita kuna hinallatak yaku shunku unkushkakuna.

YUYARINA:

Kikipak hampik mana imatapash nikipika imashina mikushpa shamushka hinallatak katinallami. Upiyanata kuskashpa mana ishkayta upiyanachu. Upiyachina hampik manaywan hinallatak paypak kamaykuyan. Hawalla hampimi kan.

SHUK HAMPIKUNAWAN:

Mana unkushkakuna pitaripayta rurashkapika Terbinafina hampika ashallami hampikunapak clearance nishkata harkanpakak na kashpaka chayachinkapak.

LLAKIKUNA RIKURIMUN:

Terbinafina hampika allimi chaskishka kan. Llakikunata ashallami rikurimun. Ashtawan rikushkakunaka gastrointestinales hinallatak reacciones músculo-esqueléticas (artralgias mialgias) nanaykunami kan.

MASHNATAK SHINALLATAK IMASHINA UPIYANA:

Wawakuna 20 kg uray: 62,5 mg punchapi shuk kutin.

Rukukuna: shuk 250 mg hampita punchapi huk kutin.

Mashna pachata kay hampita upiyana: Tiña pedis 2 6

hunkaykuna. Tiña corporis, cruris: 2-4 hunkaykuna.

Candidiasis cutánea: 2-4 hunkaykuna. 6 -12 hunkaykunata kay hampiwana katikpimi ashtawan sumakta hampirinka

HATUYPAK TUPU

Millka 1, 2, 3, 4, 5, 10 Sapan chuya puntukuna. 10 takakunawan

Millka 1, 2, 3, 4, Sapan chuya puntukuna. 7 takakunawan

HAMPIKPAK TUPU

Milika x 1 sapan chuya puntu 1, 2 takakunawan

HAMPIWASIPAK TUPU

Millka x 10, 15, 20 sapan chuya puntukuna 10 takakunawan

WAKAYCHIY:

30°C chirikunukta na yallishpa charina. Chirilla chakishka kuskapi wakaychina. Tukuy hampikunata wawakunamanta karullami charina.

VENTA BAJO RECETA  
MÉDICA

HAMPIKPAK MAÑAYWAN HATUNA

ELABORADO POR QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. QUITO- ECUADOR  
PARA SKINDERM S.A. CUENCA- ECUADOR