



TERFINAMED

COMPOSICIÓN:

Terfinamed Crema

Cada 100g de crema contiene: Terbinafina clorhidrato equivalente a Terbinafina base 1g. Excipientes: Alcohol bencílico, Alcohol cetílico, Alcohol estearílico, Sorbitan monoestearato, Polisorbato 60, Miristato de Isopropilo, Hidróxido de sodio. Agua.

GRUPO TERAPÉUTICO:

Antifúngico

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y

MECANISMO DE ACCIÓN:

La Terbinafina es una alilamina que tiene un amplio espectro de actividad antimicótica frente a hongos patógenos de la piel, pelo y uñas incluyendo dermatofitos.

FARMACOCINÉTICA:

Menos del 5% de la dosis es absorbida tras la aplicación local a seres humanos, así, la exposición general es muy baja.

Cuando se administra por vía tópica posee un comienzo rápido de acción y puede ser efectivo con un tratamiento de corta duración.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de infecciones a la piel causadas por hongos en pies, manos, axilas e ingle.

- Onicomiosis causada por hongos dermatofitos.
- Tiña capitis
- Infecciones micóticas de la piel tales como: tiña corporis, tiña cruris y tiña pedis.
- Infecciones cutáneas por levaduras causadas por género Cándida (por ej.: Cándida albicans).

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la terbinafina o a cualquiera de los componentes.

PRECAUCIONES:

En el embarazo y lactancia consulte a su médico. Se debe evitar el contacto con los ojos y las mucosas y en caso de presentarse reacciones alérgicas, se debe suspender el medicamento.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Lavar el área afectada y secar bien.

En adultos y niños mayores de 12 años aplicar una capa delgada de crema en la zona afectada 1 vez al día durante 1 semana.

El alivio de los síntomas clínicos habitualmente se produce a los pocos días de tratamiento. El Uso irregular o la suspensión se asocia con riesgo de la recurrencia. Si no hay signos de mejoría en dos semanas, debe revisarse el diagnóstico.

VÍA TÓPICA

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No se conocen interacciones medicamentosas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Ocasionalmente se presentan enrojecimiento, prurito o escozor.

ALMACENAMIENTO:

Conservarse a una temperatura no mayor a 30°C. Consérvese en un lugar fresco y seco.

Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Tubox 5, 10, 15, 20, 30, 50g

MUESTRA MÉDICA:

Tubox 5,10g

PRESENTACIÓN HOSPITALARIA:

Tubo x 20,30,50g

IMA CHARIK:

Terfinamed Api hampi Sapan 100g api hampi charinmi:

Terbinafina clorhidrato kayka Terbinafina base 1g kan:

Charishkakuna: Alcohol bencílico, Alcohol cetílico, Alcohol estearílico, Sorbitan mono estearato, Polisorbato 60, Miristato de Isopropilo, Hidróxido de sodio, yaku.

IMA HAMPI LAYAMAN WANKURISHKA

Antifúngico

KAY HAMPI IMAPAK ALLIKAN:

Terbinafina hampika alilamina nishkami kan, kayka karamanta, akchamanta shillumantapash sisukunata pichakmi.

HAMPIIMATAK RURAK:

Rurakunapi 5% patsakrikaman churashkaka allimi chaskishka.

Hapashpa churakpi utkalla ashtawan allimi hampirin Shina llatak asha pachakunapí.

IMAPAK CHURANA:

Chakipi makikunapi rikra ukukunapi chanka ukukunapi sisu

nanachishkakunata hampinkapak.

- Dermatofitos sisu onicomiosismanta Onicomiosis unkuy.
- Tiña corporis, tiña cruris shinallatak tiña pedis kara nanaykuna.
- Cándida (Cándida albicans) sisu karata unkuchishkapi.

MANA CHURANA:

Terbinafina hampita mana chaskiy ushakkuna.

YUYARINA

Wiksayuk kashpa shinallatak chuchuchikuy pachapi kikinpak hampikta tapupay.

Nawiman Shinallatak sinkaman mana kimichinachu shinallatak alergia nishkakuna rikurikpika kay hampita sakinami.

Nanaykuma katikpika kikinpak hampikta tapupay.

MASHNATAK SHINALLATAK IMASHINA CHURANA:

Mayllashpa allipacha chakichina.

Rukukunapi shinallatak 12 wata yalli wawakunapi ashalla hampita punchapi shuk kutin shuk hunkayta churana.

Nanaykunaka hampita asha punchakunata churakpi samarishpa katinllami. Wakinpilla mawkashpa shinallatak hampiriyta mana tukuchikpi kutin llukshimunallami. Ishkay hunkaykaman mana allitukukpika kutin rikurinkapak rinami.

KARAPI CHURASHPA

SHUK HAMPIKUNAWAN

Interacciones medicamentosas nishkaka mana rikurishkachu.

LLAKIKUNA RIKURIMUN

Wakinpillami pukayaykuna, shikshi, rikurin

WAKAYCHY:

30°C chirikunukta mana yallishpa charina. Chirilla chakishka kuskapi wakaychina. Tukuy hampikunata wawakunamanta karullami charina.

HATUYPK TUPU:

Tutu x 5, 10, 15, 20, 30,50g

HAMPIKPAK TUPU:

Tutux5, 10g

HAMPIWASIPAK TUPU:

Tutu x 20,30,50g

VENTA LIBRE

PIMANPASH HATUNALLA

ELABORADO POR **QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.** QUITO- ECUADOR
PARA SKINDERM S.A. CUENCA- ECUADOR